

瓜叶乌头一新变种

郭平 贾敏如

(成都中医学院中药系, 成都610072)

A NEW VARIETY OF ACONITUM HEMSLEYANUM

Guo Ping, Jia Minru

(Chengdu College of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610072)

白花瓜叶乌头 新变种

Aconitum hemsleyanum Pritz. var. *leueanthum* P. Guo et M. R. Jia, var. nov.

A var. *hemsleyano* differt caule sparse adpresso-puberulo, bracteolis densiuscule adpresso-puberulis, sepalis albis lilacino-nervosis, eo minore et humiliore 1.4—1.7 cm alto 1.4—1.5 cm a basi ad apicem rostri metiente, petalis minoribus, limbis 6—8 mm longis, labiis 3—4 mm longis.

Sichuan (四川): Anxian (安县), Chaping Xiang, Laowanggou village, Zeng's mountains, alt. 1520—1650 m, Aug. 30, 1987, P. Guo (郭平) 87-013 (Holotype! Deposited in Herb. Chengdu Trad. Med. Coll.); Beichuan (北川), Xiaoba Xiang, Maojiagou, alt. 1300—1500 m, Aug. 24, 1986, P. Guo 8608002; Shifang (什邡), Hongbai Xiang, Xiamako, Yinghua mountains, alt. 1400—1900 m, Sept. 14, 1989, P. Guo 89-001.

本变种与瓜叶乌头的区别是: 茎疏被贴伏的短柔毛; 小苞片密被贴伏的短柔毛; 萼片白色, 有淡紫色脉纹, 上萼片高1.4—1.7cm, 下缘长1.4—1.5cm, 瓣片长6—8mm, 唇长3—4mm。

本变种的块根在安县、北川县、什邡县大量收购, 作中药草乌使用。

致谢: 本文承王文采先生指导, 谨致谢忱。